

*3<sup>i</sup> paris aculeis apicalibus minutissimis munito sed metatarso & paris omnino nudi. Pedes-marillares mediocres, fuscopicei, parvae et longe nigro-criniti; tibia patella breviore, apophysi apicali articulo longiore, antice oblique directa, apice tenui et leviter incurva, extus armata; tarsus sat angustus orato, apice acuminato; bulbo orato, apice area magna rufula nubinato.*

Forêt du Nirou.

16. EUPALIA RUBRA Workman, Malaysian Spiders, pars XIII, 1896, p. 104. (*Laynus*. — E. Simon, in Ann. Soc. ent. Belg., XLIII, 1899, p. 104).

Décrit de Singapore par T. Workman, nous l'avons déjà indiqué de Padang (Sumatra).

Forêt du Nirou.

17. DONOESSUS NIGRICEPS E. Simon, loc. cit. 1899, p. 103 (sub *Hassarius*).

Décrit de Padang.

Forêt du Nirou.

## LV

### ARACHNIDES RECUUEILLIS A LA TERRE-DE-FEU PAR M. LE D<sup>E</sup> LEHMANN-NITSCHE EN MARS ET AVRIL 1902.

Les Arachnides dont je donne ci-après la liste ont été recueillis par le Dr Lehmann-Nitsche dans les environs du *Rio-del-Fuego* au Nord-Est de la Terre-de-Feu; en remontant le cours du fleuve cet habile voyageur a pu pénétrer dans l'intérieur des terres et explorer une région jusqu'ici inconnue, dont la faune paraît un peu différente de celle de la côte.

1. AUXIMUS FUEGIANUS E. Simon, in Bull. Soc. zool. Fr., IX, 1884, p. 128 (*Amaurobius*).

Commun dans la région fuégienne et la Patagonie australe.

2. THERIDION MICHAELSENI E. Simon, in Hamb. Magalb. Sammelreise, Ar., 1902, p. 14.

Espèce variable comme coloration: l'un des individus capturés par le Dr Lehmann-Nitsche est conforme au type, son abdomen est d'un blanc jaunâtre pâle avec deux très larges bandes dorsales d'un blanc opaque, découpées et formées de taches irrégulières confluentes; un

autre individu a l'abdomen d'un fauve rougeâtre orné en dessus de deux larges bandes n'atteignant pas ses extrémités, carminées en avant, noires en arrière et de quatre taches medianes d'un jaune opaque disposées en carré, les antérieures plus grosses.

3. **HAPLINIS POLLICATUS** (Tullgren).

*Tueticus pollicatus* Tullgreen, in Sv. Exped. t. Magell., II, Arachn. n° 50, 1901, p. 206.

Indiqué par Tullgren de la Terre-de-Feu et de la Patagonie australe.

Le Dr Lehmann-Nitsche a capturé dans la même localité une femelle du genre *OEdothorax*, que je ne puis déterminer avec certitude.

4. **Smermisia Tullgreni**, sp. nov. — ♀ long. 3 mill. — *Cephalothorax oratus, parte cephalica sat convexa, fronte subtruncata, laevis et glaber, fusco-olivaceus, regione oculari nigra, parte cephalica pone oculos lineolis obscurioribus confusa notata. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii lateralibus (leviter prominulis) duplo minores et a lateralibus quam inter se saltem duplo remotiores. Oculi postici in lineam non multo latiorem, superne risam, leviter recurvam, inter se appropinqui, medii lateralibus fere duplo majores et valde prominuli. Area mediiorum longior quam latior et antice quam postice multo angustior. Oculi laterales utrinque aquâ a sese distantes. Clypeus depresso, area oculorum paulo angustior. Chelae fusco-rufulæ, laeves, longæ, margine superiore sulci dentibus longis trinis denteque ultimo parvo, inferiore dentibus multo minoribus 3 vel 4 armatis, ungue longo. Laminae olivaceæ. Pars labialis sternumque nigra et nitida. Pedes parum longi, fulvo-rufuli, sat longe pilosi, tarsis anticis metatarsis vix brevioribus. Plaga genitalis nigra, leviter convexa et subtiliter transversim striata, orato transversa, ad marginem posticum prominula et forcata.*

Cette espèce diffère beaucoup du *S. caracasana* E. Sim., par sa coloration obscure, ses yeux médians antérieurs bien séparés des latéraux, ses pattes de la 4<sup>e</sup> paire plus longues que les antérieures, etc.

M. Tullgren en a décrit deux espèces de Patagonie : *S. barbata* et *nigro-capitata* Tullgren, la première est beaucoup plus petite, la seconde a une coloration différente.

5. **Linyphia Lehmanni**, sp. nov. — ♀ long. 2,5 mill. — *Cephalothorax laevis et nitidus, fulvo-rufescens, tenuiter et confuse nigricantimarginatus, area oculorum mediiorum nigra. Oculi postici in lineam subrectam, medii leviter et singulariter prominuli, nigri, lateralibus*

*paulo maiores et inter se quam a lateralibus paulo remoliores. Oculi antici in lineam vir recturam, inter se subaequales, medii inter se subcontigui a lateralibus spatio oculo paulo latiore distantes. Area mediorum circiter aequa longa ac postice lata et multo latior postice quam antice, oculi medii postici anteriores maiores. Clypeus area oculorum haud vel vir angustior. Abdomen oblongum, postice acuminatum, nigro-nitidum, supra paulo dilutius, maculis nigris seriatis et utrinque ritta alba, postice dirisa, ornatum. Chelae fusco-rufulae. Partes oris sternunque nigra et nitida sed sternum granulis setiferis paucis conspersum. Pedes fulvo-olivacei, tarsis infuscatis. Area genitalis leviter convexa, foreola transversa, pons duplo latiore quam longiore et carinula tenui divisa, impressa.*

Sans doute voisin de *L. meridionalis* Tullgren, dont le mâle seul est décrit; mais les yeux, qui en général ne varient pas d'un sexe à l'autre, sont différents; les yeux postérieurs du *L. meridionalis* sont décrits égaux et en ligne un peu recurvée. *L. Lehmanni* E. Sim., rentre dans le groupe du *L. clathrata* Sundevall.

#### 6. ARANEUS FLAVIVENTRIS (Nicole).

7. TOMOPISTHES TAENIATUS E. Simon, in Bull. Soc. zool. Fr., XI, 1886, p. 371.

Découvert dans la Patagonie argentine (S<sup>ma</sup> Cruz), trouvé depuis à Punta Arenas (Patagonie chilienne) et à la Terre-de-Feu (Michaelsen).

8. T. INJUCUNDUS E. Simon, in Hamb. Magalb. Sammelreise, Ar., 1902, p. 33.

Découvert par le Dr Michaelsen dans la Patagonie chilienne et à la Terre-de-Feu, retrouvé en grand nombre par le Dr Lehmann-Nitsche.

9. **T. aethiops**, sp. nov. — ♂ long. 5-6 mill. — *Cephalothorax ovatus, antice parum attenuatus, fronte lata, niger et nitidus, longe albido-pilosus. Oculi postici parvi et aequales, in lineam procurvam, medii a sese quam a lateralibus evidenter remoliores. Oculi antici in lineam multo angustiorem rectam, inter se aequales, medii a sese anguste distantes a lateralibus contigui. Oculi quatuor medii inter se aequales, aream paulo longiorem quam postice latiorem et postice quam antice multo latiorem occupantes. Oculi laterales utrinque spatio oculo latiore a sese distantes. Abdomen longe oblongum, supra nigrum, cæbre et longe albido-sericeo pubescens, antice maculis binis, dein maculis biseriatis confusis valde laciniosis et nigro-punctatis flavidis ornatum, subtus nigro-flavidoque variegatum. Chelae fusco-rufulae, nitidae, subtiliter trans-*

*versim striatae, margine superiore sulci dentibus contiguis trinis, medio majore, inferiore dentibus multo minoribus binis armatis. Partes oris fusco-castaneae. Sternum nigrum, nitidum. Pedes parum longi, obscure fulvi, nigricanti-variati et subannulati, tibiis antice aculeis inferioribus tenuibus et sat longis 2-2 armatis<sup>(1)</sup>, metatarsis usque ad basin leviter scopulatis, aculeis subbasilaribus similibus binis munitis. Plaga genitale magna, subquadrata nigra et pilosa, area media triquetra leviter depressa paulo dilutiore et rugosa notata.*

Espèce remarquable par sa petite taille, sa coloration, ses yeux antérieurs égaux et resserrés, ses yeux médians postérieurs plus séparés l'un de l'autre que des latéraux.

10. **Liparotoma amaeenum** E. Simon, in Bull. Soc. zool. Fr., IX, 1884, p. 128, et Mission du Cap Horn (E.), p. 34. — ♀ long. 9 mill. — *Cephalothorax fusco-rufescens, parte thoracica fere nigra, subtilissime coriaceus, sat crebre luteo-albido-pilosus, Oculi postici in lineam leviter procurvam, parci, inter se aequi et fere aequidistantes. Oculi antici in lineam rectam multo angustiorem, inter se aequales. Abdomen lute ornatum, supra rubro-castaneum et breviter fulvo-pubescent, antice vitta media angusta nigra, medium attingente, postice vitta lutea ornatum, utrinque nigro-punctatum, albido-pilosum et submarginalum, postice sensim nigricans sed linea albo-pilosa, in medio angulosa, marginatum, subtus fulvo-rufescens utrinque infuscatum. Chelae validae et convervae, rufulae, praesertim extus rugosae, margine superiore sulci dentibus trinis medio majore, inferiore dentibus binis minoribus inter se distan- tibus, armatis. Partes oris sternumque fusco-castanea fere nigra, laetitia. Pedes robusti et breves, fulvo-rufuli, parce et sat longe pilosi, femoribus annulo apicali latissimo sinuoso supra bilineato et subtus annulo subme- dio angustiore, nigricantibus notatis, patellis nigricanti-notatis, tibiis cunctis metatarsisque posticis annulis binis dentatis cinctis.*

On ne connaît jusqu'ici qu'un seul individu jeune de cette espèce rapporté de la région suégienne par la Mission française, dite du Cap Horn.

11. **RUBRIUS SUBFASCIATUS** E. Sim.

12. **EMMENOMMA OCULATUM** E. Sim.

(1) Les jeunes n'ont qu'une seule paire d'épines en dessous aux tibias.